

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel

SANOCID EXTRA

- ✓ parfümfrei
- ✓ für sensible Haut empfohlen
- ✓ begrenzt viruzid PLUS in 30 Sekunden

Begrenzt viruzid PLUS wirksames, alkoholisches Händedesinfektionsmittel zur Anwendung auf der Haut. Sanocid extra ist besonders hautverträglich. Es ist aufgrund seiner anwendungsfreundlichen Wirkstoffkombination in der Lage, ein umfassendes Wirkungsspektrum bei gleichzeitiger Hautpflege- und Hautschutzwirkung zu erreichen.

Anwendungsgebiete:
Hygienische und chirurgische Händedesinfektion

Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten: 65 g Ethanol.

Anwendung:
Gebrauchsfertige Lösung zum Einreiben in die trockenen Hände. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das unverdünnte Präparat feuchtgehalten werden.

Gefahr:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

I. Hygienische Händedesinfektion (EN 1500):

Eine ausreichende Menge sanocid extra unverdünnt während 30 Sekunden auf beiden Händen verreiben. Hierbei insbesondere Fingerkuppen, Daumen und Nagelfalze berücksichtigen und ggf. portionsweise erneut Händedesinfektionsmittel aufbringen.

Nur zur professionellen Anwendung.

II. Chirurgische Händedesinfektion (EN 12971):

Eine ausreichende Menge sanocid extra unverdünnt während 2 Minuten auf beiden Händen und Unterarmen verreiben.

Wirkspektren und Einwirkzeiten:

Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion (gem. VAH / EN 1500).....	30 Sek.
Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion (gem. EN 12971).....	2 Min.
Tuberkulozid (M. terrae) gem. EN 14348	30 Sek.
Mykobakterizid (M. terrae und M. avium) gem. EN 14348.....	30 Sek.
Alle behüllten Viren inkl. Corona-Viren (begrenzt viruzid gem. EN 14476)	15 Sek.*
begrenzt viruzid PLUS gem. EN 14476	30 Sek.
wirksam gegen Adeno-Viren gem. EN 14476	30 Sek.
wirksam gegen Noro-Viren (MNV) gem. EN 14476	30 Sek.

* Für die hygienische Händedesinfektion ist eine Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden einzuhalten.

Zulassung und Listungen:

Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste (www.iho-viruzidie-liste.de).
Gemeldet als Biozid-Produkt bei der baua unter der Reg.-Nr. N-91340

Haltbarkeit nach Anbruch:

Im Spendersystem: 6 Monate
Längstens siehe Aufdruck auf dem Etikett zur max. Verwendbarkeit: 



Stand der Information: 2020-05

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Nur zur professionellen Anwendung, kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Verfügbare Gebindegrößen	REF
500 ml Flasche	457OP005
1000 ml Flasche	457OP010
5000 ml Kanister	457OP050