



# sanocid gel

## Gebrauchsfertiges, alkoholisches Händedesinfektionsmittel

- parfümfrei
- frei von Langzeitwirkstoffen
- rückfettend
- Noro-Viren wirksam in 15 Sekunden

### Präparatetyp

**sanocid Gel** ist ein alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsgel zur Händedesinfektion mit rückfettender Eigenschaft. Durch die Gelform besonders praktisch in der Anwendung. **sanocid Gel** enthält keine kumulierenden Langzeitwirkstoffe und ist wirksam gegen Noro-Viren.

### Anwendungsgebiete

Zur persönlichen Händehygiene.

### Anwendung

**sanocid Gel** zur persönlichen Hygiene in die Hände einreiben und 30 Sekunden lang feucht halten.

### Wirkungsspektrum

**sanocid Gel** wirkt:

- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- levurozid
- virusinaktivierend (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vakzina-, Influenza-/Grippe- und Rota-, Adeno-, Polio und Noro-Viren)

### Einwirkzeiten

hygienische Händedesinfektion	
gem. VAH/DGHM/ EN1500	konz. 30 Sek.
bakterizid (inkl. MRSA), levurozid	konz. 30 Sek.
tuberkulozid gem. EN14348	konz. 30 Sek.
virusinaktivierend inkl. HBV,HIV,HCV, BVDV, Vakzina-, Rota-, Adeno-, Polio und Influenza-/Grippeviren)	konz. 1 Min.
Noro-Viren(MNV)	konz. 15 Sek.*

\* Mindesteinwirkzeit beachten

### Zusammensetzung

In 100 g Lösung sind als wirksamer Bestandteil enthalten: 80,8 g Ethanol

### Listung / Zulassungen

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.

### Lieferformen

Gebinde	Art.-Nr.	VE	PZN
150 ml	40 91 51	20	9096467
500 ml	40 91 52	20	9096473
1 Liter	40 91 53	12	9096496

### Dosierhilfen

Wandspender, Dosierpumpe.

### Besondere Hinweise

Leichtentzündlich. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen! Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

baua Reg.-Nr. N-43214